



Vaccination contre la grippe en pratique de groupe : La deuxième fois est-elle la bonne ?

Dr Ilke Cabus, Geneeskunde voor het Volk Hoboken

Introduction

Une évaluation de la vaccination contre la grippe et de son enregistrement a été effectuée en 2004 au sein de la pratique de médecins généralistes *Geneeskunde voor het Volk* d'Hoboken. Cette évaluation a montré que notre vaccination (et son enregistrement) était mauvaise par comparaison avec la vaccination pratiquée en Flandre et

dans les autres pratiques de *Geneeskunde voor het Volk*.^{1,2,3,4}

	Population à risque (18-65 ans)	65+
GVHV Hoboken 2004-2005	20%	48%
GVHV Deurne 2005-2006	82%	82%
GVHV Genk 2005-2006	/	81%
Flandre	46%	59%

Tableau 1 : Aperçu du taux de vaccination dans les pratiques de groupe *Geneeskunde voor het Volk* d'Hoboken, Deurne et Genk et en Flandre

Question d'étude

Le taux de vaccination de notre pratique peut-il être amélioré par un bon enregistrement et la convocation des patients à risque âgés de 18 à 65 ans et de plus de 65 ans ?

Méthodologie (cercle PDCA)

En 2004, le Dr De Vos a déjà mené une étude sur le statut de la vaccination contre la grippe dans notre pratique de groupe. Des recommandations ont été formulées.¹

Ces recommandations ont été prises en compte lors de la rédaction d'un protocole visant l'amélioration du statut de la vaccination durant l'été 2006. (*Plan*)

À partir d'août 2006, des prescriptions de vaccination contre la grippe ont été diffusées parmi les patients à risque âgés de 18 à 65 ans et auprès de tous les patients de plus de 65 ans. Un enregistrement correct et complet a été effectué. Les patients sont informés via plusieurs canaux.

Nos patients sont vaccinés depuis le 12 octobre par un praticien de l'art infirmier lors d'une consultation ouverte. Tout cela est également enregistré correctement et complètement. (*Do*)

Le 10 novembre, une liste comparative a été établie avec les patients qui n'étaient pas encore vaccinés et une liste avec les patients n'ayant encore reçu aucune prescription. (*check*)

Les patients qui n'étaient pas encore vaccinés et n'avaient pas reçu de prescription ont été convoqués personnellement et une prescription leur a été envoyée de sorte qu'ils puissent encore se faire vacciner avant le 30 novembre. (*act*)

Barrières et obstacles

La mise à disposition tardive des vaccins et les plannings de consultation serrés, débouchant sur un sous-enregistrement, sont des barrières importantes qui ont été constatées.

La délimitation du groupe cible rendue difficile en raison du caractère incomplet du DME et le peu de motivation de nos médecins à procéder à l'enregistrement et à la vaccination sont les principaux obstacles relevés dans le cadre du projet.

Sources

1. Vaccination contre la grippe. Mythe et faits dans une pratique de groupe.
Projet de pratique Karen de Vos 2004-2005
2. Campagne de vaccination contre la grippe
Projet de pratique Thomas Engelbeen 2005-2006

3. Implémentation de l'évidence : évident ? Projet d'amélioration de la qualité : application de la directive WVVH « Prévention de la grippe ».
Peter Leysen, Annelies van Linden, Dirk Van Duppen
4. LOGO ville d'Anvers
5. Avis du Conseil supérieur d'hygiène : vaccination contre la grippe saisonnière.
Hiver 2006-2007
6. Directive WVVH : Prévention de la grippe