

II

HOOFDSTUK II

Vergoedingsvoorwaarden voor de vergoedbare specialiteiten zonder voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer, met een controle achteraf

A.- Toepassingsmodaliteiten

Wanneer de voorschrijvende arts een specialiteit opgenomen in dit hoofdstuk voorschrijft voor een indicatie

die terugbetaald wordt volgens de vergoedingsmodaliteiten zoals ze daarvoor uitgewerkt zijn in hoofdstuk IV van deze lijst, brengt hij op het voorschrift de vermelding "IV" aan. In dat geval wordt de betrokken specialiteit slechts vergoed mits voorlegging van een machtiging van de adviserend geneesheer.

B.- Lijst van de zonder voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer vergoedbare specialiteiten, met een controle achteraf

Paragraaf 10000

§ 10000 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraaf 20000

Protonpompinhibitoren (ATC A02BC) vergoedbaar in categorie B:

II

CHAPITRE II

Conditions de remboursement des spécialités remboursables sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle a posteriori

A.- Modalités d'application

Lorsque le médecin prescripteur prescrit une spécialité reprise dans ce chapitre pour une indication

remboursée selon les modalités de remboursement telles qu'elles ont été élaborées à cet effet au chapitre IV de cette liste, il appose sur l'ordonnance la mention "IV". Dans ce cas, la spécialité concernée est remboursable qu'après la soumission d'une autorisation du médecin conseil.

B.- Liste des spécialités remboursables sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle a posteriori.

Paragraphe 10000

§ 10000 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraphe 20000

Inhibiteurs de la pompe à protons (ATC A02BC) remboursables en catégorie B :

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE AB 20 mg			AUROBINDO NV		ATC: A02BC05			
B-48	2990-703 2990-703	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	18,03 9,68	18,03 9,68	2,57	4,28

B-48 *	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1249	0,1249		
B-48 **	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1026	0,1026		
B-48 ***	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0257	0,0428
ESOMEPRAZOLE AB 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC05			
B-48	2990-729	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,64	12,64	1,47	2,46
	2990-729				5,56	5,56		
B-48 *	7700-644	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2564	0,2564		
B-48 **	7700-644	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2104	0,2104		
B-48 ***	7700-644	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2597	0,2597	0,0525	0,0879
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: A02BC05			
B-48	2894-236	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,79	15,79	2,12	3,53
	2894-236				7,98	7,98		
B-48	2893-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	17,80	17,80	2,52	4,20
	2893-519				9,51	9,51		
B-48 *	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
B-48 **	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
B-48 ***	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1269	0,1269	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC05	
B-48	2893-527	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,97	12,97	1,54	2,57
	2893-527				5,82	5,82		
B-48 *	0755-256	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2682	0,2682		
B-48 **	0755-256	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
B-48 ***	0755-256	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2718	0,2718	0,0550	0,0918
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC05			
B-48	3494-234	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,72	15,72	2,10	3,50
	3494-234				7,92	7,92		
B-48	2738-532	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	17,79	17,79	2,52	4,20
	2738-532				9,50	9,50		
B-48 *	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1251	0,1251		
B-48 **	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
B-48 ***	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1268	0,1268	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC05	
B-48	2738-557	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,65	12,65	1,48	2,46
	2738-557				5,57	5,57		
B-48 *	0757-518	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2568	0,2568		

B-48 **	0757-518	hard, 40 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2107	0,2107		
B-48 ***	0757-518	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2601	0,2601	0,0529	0,0879
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: A02BC05								
B-48	2886-695	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,55	15,55	2,07	3,44
	2886-695				7,79	7,79		
B-48	2889-905	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,27	19,27	2,82	4,70
	2889-905				10,64	10,64		
B-48 *	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1373	0,1373		
B-48 **	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-48 ***	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC05								
B-48	2880-862	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,97	12,97	1,54	2,57
	2880-862				5,82	5,82		
B-48 *	0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2682	0,2682		
B-48 **	0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
B-48 ***	0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2718	0,2718	0,0550	0,0918
LANSOPRAZOL AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC03								
B-48	2248-508	56 capsules, hard, 15 mg	56 gélules, 15 mg	G	14,64	14,64	1,88	3,13
	2248-508				7,09	7,09		
B-48 *	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1634	0,1634		
B-48 **	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1343	0,1343		
B-48 ***	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1656	0,1656	0,0336	0,0559
LANSOPRAZOL AB 30 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2248-524	56 capsules, hard, 30 mg	56 gélules, 30 mg	G	23,50	23,50	3,70	6,16
	2248-524				13,94	13,94		
B-48	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,86	22,86	3,55	5,92
	2650-745				13,39	13,39		
B-48 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
B-48 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
B-48 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2083	0,2083	0,0423	0,0705
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
B-48	3318-813	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,69	14,69	1,89	3,15
	3318-813				7,13	7,13		
B-48 *	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1643	0,1643		
B-48 **	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1350	0,1350		

B-48 ***	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1666	0,1666	0,0337	0,0562
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03				
B-48	3318-755	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,53	23,53	3,70	6,17
	3318-755				13,97	13,97		
B-48 *	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3220	0,3220		
B-48 **	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2645	0,2645		
B-48 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3244	0,3244	0,0661	0,1102
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
B-48	2341-493	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	15,39	15,39	2,03	3,39
	2341-493				7,67	7,67		
B-48 *	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
B-48 **	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
B-48 ***	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2341-527	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,13	24,13	3,82	6,41
	2341-527				14,49	14,49		
B-48	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,96	27,96	4,35	7,32
	2341-519				17,84	17,84		
B-48 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
B-48 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
B-48 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0444	0,0747
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
B-48	2257-608	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	15,39	15,39	2,03	3,39
	2257-608				7,67	7,67		
B-48 *	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
B-48 **	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
B-48 ***	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2257-632	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,45	24,45	3,86	6,49
	2257-632				14,78	14,78		
B-48	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,95	27,95	4,35	7,31
	2257-590				17,83	17,83		
B-48 *	0782-243	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2348	0,2348		

B-48 **	0782-243	hard, 30 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1929	0,1929		
B-48 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0444	0,0746
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC03								
B-48	3494-804	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	15,39	15,39	2,03	3,39
	3494-804				7,67	7,67		
B-48 *	0783-894	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
B-48 **	0783-894	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
B-48 ***	0783-894	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2328-557	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,13	24,13	3,82	6,41
	2328-557				14,49	14,49		
B-48	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,73	26,73	4,18	7,03
	2328-565				16,77	16,77		
B-48 *	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2208	0,2208		
B-48 **	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1814	0,1814		
B-48 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0427	0,0717
LOSEC MUPS 10 mg EUROCEPT ATC: A02BC01								
B-48	1618-214	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	13,90	13,90	1,73	2,88
	1618-214				6,52	6,52		
B-48 *	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1502	0,1502		
B-48 **	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1234	0,1234		
B-48 ***	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1524	0,1524	0,0309	0,0514
LOSEC MUPS 20 mg EUROCEPT ATC: A02BC01								
B-48	2095-438	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	19,63	19,63	2,89	4,82
	2095-438				10,91	10,91		
B-48 *	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2514	0,2514		
B-48 **	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2064	0,2064		
B-48 ***	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2548	0,2548	0,0516	0,0861
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05								
B-48	1597-004	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	15,72	15,72	2,10	3,50
	1597-004				7,92	7,92		
B-48	2692-010	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	19,00	19,00	2,76	4,61
	2692-010				10,42	10,42		
B-48 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
B-48 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1128	0,1128		

B-48 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC05	
B-48	1596-998	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	12,96	12,96	1,54	2,57
	1596-998				5,81	5,81		
B-48 *	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2679	0,2679		
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2200	0,2200		
B-48 ***	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2714	0,2714	0,0550	0,0918
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: A02BC01	
B-48	4380-119	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,30	13,30	1,61	2,68
	4380-119				6,07	6,07		
B-48	4380-127	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,88	17,88	2,54	4,23
	4380-127				9,57	9,57		
B-48 *	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1235	0,1235		
B-48 **	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1014	0,1014		
B-48 ***	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1252	0,1252	0,0254	0,0423
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	3527-686	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,85	18,85	2,73	4,56
	3527-686				10,31	10,31		
B-48	3078-151	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,10	23,10	3,60	6,01
	3078-151				13,59	13,59		
B-48 *	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1754	0,1754		
B-48 **	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1441	0,1441		
B-48 ***	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1773	0,1773	0,0360	0,0601
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV					ATC: A02BC01	
B-48	3078-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,82	19,82	2,93	4,89
	3078-169				11,06	11,06		
B-48	3527-694	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	31,84	31,84	4,90	8,23
	3527-694				21,22	21,22		
B-48 *	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4889	0,4889		
B-48 **	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4016	0,4016		
B-48 ***	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5164	0,5164	0,1046	0,1746
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV					ATC: A02BC01	
B-48	2227-171	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,81	19,81	2,93	4,88
	2227-171				11,05	11,05		

B-48 *	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5093	0,5093		
B-48 **	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4182	0,4182		
B-48 ***	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5160	0,5160	0,1046	0,1743
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-227	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	14,07	14,07	1,76	2,94
	1767-227				6,65	6,65		
B-48	1767-243	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	18,95	18,95	2,76	4,59
	1767-243				10,39	10,39		
B-48 *	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
B-48 **	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1123	0,1123		
B-48 ***	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1387	0,1387	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	1767-367	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,63	19,63	2,89	4,82
	1767-367				10,91	10,91		
B-48	1767-318	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	24,07	24,07	3,81	6,40
	1767-318				14,44	14,44		
B-48 *	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
B-48 ***	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2647-089	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,63	19,63	2,89	4,82
	2647-089				10,91	10,91		
B-48	3373-594	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	24,07	24,07	3,81	6,40
	3373-594				14,44	14,44		
B-48 *	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-48 **	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
B-48 ***	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	13,99	13,99	1,75	2,92
	1767-300				6,60	6,60		
B-48	1767-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,82	19,82	2,93	4,89
	1767-342				11,06	11,06		
B-48	1767-292	56 maagsapresistente capsules,	56 gélules gastro-résistantes, 40	G	33,25	33,25	5,09	8,56

		hard, 40 mg	mg						
	1767-292				22,45	22,45			
B-48 *	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5173	0,5173			
B-48 **	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4250	0,4250			
B-48 ***	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529	
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,82	19,82	2,93	4,89	
	3520-350				11,06	11,06			
B-48	2647-097	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,25	33,25	5,09	8,56	
	2647-097				22,45	22,45			
B-48 *	0794-305	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5173	0,5173			
B-48 **	0794-305	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4250	0,4250			
B-48 ***	0794-305	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529	
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,99	13,99	1,75	2,92	
	3494-812				6,60	6,60			
B-48	2705-713	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	G	18,22	18,22	2,61	4,34	
	2705-713				9,83	9,83			
B-48 *	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1269	0,1269			
B-48 **	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1042	0,1042			
B-48 ***	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1286	0,1286	0,0261	0,0434	
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	2726-172	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	19,44	19,44	2,86	4,76	
	2726-172				10,77	10,77			
B-48	2705-747	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	23,95	23,95	3,80	6,33	
	2705-747				14,33	14,33			
B-48 *	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1849	0,1849			
B-48 **	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1519	0,1519			
B-48 ***	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0380	0,0633	
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC01				
B-48	2726-180	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	G	20,19	20,19	3,01	5,01	
	2726-180				11,34	11,34			
B-48	3494-820	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,19	32,19	4,94	8,31	

	3494-820				21,52	21,52		
B-48 *	0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4959	0,4959		
B-48 **	0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4073	0,4073		
B-48 ***	0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4791	0,4791	0,0882	0,1484
OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
B-48	1712-249	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	14,09	14,09	1,77	2,95
	1712-249				6,67	6,67		
B-48	2417-731	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	19,23	19,23	2,81	4,69
	2417-731				10,60	10,60		
B-48 *	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
B-48 **	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
B-48 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1386	0,1386	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	1705-466	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	G	19,63	19,63	2,89	4,82
	1705-466				10,91	10,91		
B-48	2417-749	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	24,34	24,34	3,85	6,46
	2417-749				14,68	14,68		
B-48 *	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
B-48	1712-231	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	20,49	20,49	3,07	5,11
	1712-231				11,57	11,57		
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,25	33,25	5,09	8,56
	2119-584				22,45	22,45		
B-48 *	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
B-48	2141-224	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	14,07	14,07	1,76	2,94
	2141-224				6,65	6,65		
B-48	2455-293	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,92	17,92	2,55	4,24
	2455-293				9,60	9,60		

B-48 *	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1239	0,1239		
B-48 **	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1018	0,1018		
B-48 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1256	0,1256	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2393-114	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,63	19,63	2,89	4,82
	2393-114				10,91	10,91		
B-48	2455-301	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	G	24,34	24,34	3,85	6,46
	2455-301				14,68	14,68		
B-48 *	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	4705-174	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,63	19,63	2,89	4,82
	4705-174				10,91	10,91		
B-48	4581-203	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	24,34	24,34	3,85	6,46
	4581-203				14,68	14,68		
B-48 *	7735-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	7735-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	7735-301	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2753-200	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,63	19,63	2,89	4,82
	2753-200				10,91	10,91		
B-48	2753-218	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	24,34	24,34	3,85	6,46
	2753-218				14,68	14,68		
B-48 *	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
B-48 **	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
B-48 ***	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
B-48	2179-935	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,82	19,82	2,93	4,89
	2179-935				11,06	11,06		
B-48	2181-642	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,25	33,25	5,09	8,56
	2181-642				22,45	22,45		

B-48 *	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A02BC01								
B-48	4765-251	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,25	33,25	5,09	8,56
	4765-251				22,45	22,45		
B-48 *	7739-055	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	7739-055	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	7739-055	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2600-559	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,25	33,25	5,09	8,56
	2600-559				22,45	22,45		
B-48 *	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2616-530	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,25	33,25	5,09	8,56
	2616-530				22,45	22,45		
B-48 *	0793-307	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
B-48 **	0793-307	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
B-48 ***	0793-307	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,58	11,58	1,26	2,10
	2557-205				4,75	4,75		
B-48	2557-213	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,98	15,98	2,15	3,59
	2557-213				8,12	8,12		
B-48	2626-968	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,98	15,98	2,15	3,59
	2626-968				8,12	8,12		
B-48 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-782	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,77	11,77	1,30	2,17
	2732-782				4,90	4,90		

B-48	2732-790	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,98	15,98	2,15	3,59
	2732-790				8,12	8,12		
B-48 *	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02			
B-48	2557-163	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	2557-163				10,72	10,72		
B-48 *	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOMED 40 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: A02BC02			
B-48	4771-663	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,73	19,73	2,91	4,85
	4771-663				10,98	10,98		
B-48 *	7740-129	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
B-48 **	7740-129	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
B-48 ***	7740-129	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2565	0,2565	0,0520	0,0866
PANTOMED 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: A02BC02			
B-48	4819-595	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	4819-595				10,72	10,72		
B-48 *	7740-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	7740-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	7740-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC02			
B-48	2732-808	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	2732-808				10,72	10,72		
B-48 *	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC02			
B-48	4381-109	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,58	11,58	1,26	2,10
	4381-109				4,75	4,75		
B-48	4381-117	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,59	15,59	2,07	3,46
	4381-117				7,82	7,82		
B-48	4381-125	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,70	15,70	2,09	3,49
	4381-125				7,90	7,90		
B-48 *	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
B-48 **	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
B-48 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0209	0,0349
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC02			
B-48	4381-141	56 maagsapresistente tabletten,	56 comprimés gastro-résistants,	G	18,61	18,61	2,69	4,48

		40 mg	40 mg			10,13	10,13		
B-48 *	4381-141 7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2334	0,2334		
B-48 **	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,1918	0,1918		
B-48 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2366	0,2366	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC02				
B-48	2650-422	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		11,58	11,58	1,26	2,10
	2650-422					4,75	4,75		
B-48	4582-128	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,89	15,89	2,13	3,56
	4582-128					8,05	8,05		
B-48 *	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1039	0,1039		
B-48 **	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0853	0,0853		
B-48 ***	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1053	0,1053	0,0213	0,0356
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC02				
B-48	4582-136	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		18,87	18,87	2,74	4,57
	4582-136					10,33	10,33		
B-48 *	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2380	0,2380		
B-48 **	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,1955	0,1955		
B-48 ***	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2412	0,2412	0,0489	0,0816
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02				
B-48	2568-061	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		11,61	11,61	1,27	2,11
	2568-061					4,78	4,78		
B-48	2568-079	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,77	15,77	2,11	3,52
	2568-079					7,96	7,96		
B-48 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A02BC02				
B-48	3689-940	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,77	15,77	2,11	3,52
	3689-940					7,96	7,96		
B-48 *	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02				
B-48	2568-095	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,39	19,39	2,84	4,74
	2568-095					10,72	10,72		
B-48 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
B-48 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2029	0,2029		
B-48 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A02BC02				
B-48	3689-957	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,39	19,39	2,84	4,74

	3689-957					10,72	10,72		
B-48 *	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
B-48 **	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2029	0,2029		
B-48 ***	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: A02BC02				
B-48	2555-175	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		11,77	11,77	1,30	2,17
	2555-175					4,90	4,90		
B-48	2555-142	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,77	15,77	2,11	3,52
	2555-142					7,96	7,96		
B-48	3303-930	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,98	15,98	2,15	3,59
	3303-930					8,12	8,12		
B-48 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC02				
B-48	3678-018	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		11,77	11,77	1,30	2,17
	3678-018					4,90	4,90		
B-48	3678-059	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,77	15,77	2,11	3,52
	3678-059					7,96	7,96		
B-48 *	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS			ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,39	19,39	2,84	4,74
	2555-126					10,72	10,72		
B-48 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
B-48 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2029	0,2029		
B-48 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC02				
B-48	3678-075	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,39	19,39	2,84	4,74
	3678-075					10,72	10,72		
B-48 *	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
B-48 **	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2029	0,2029		
B-48 ***	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC02				
B-48	3494-838	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		11,77	11,77	1,30	2,17
	3494-838					4,90	4,90		
B-48	3025-152	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,75	15,75	2,11	3,51
	3025-152					7,94	7,94		
B-48	3093-200	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,98	15,98	2,15	3,59

	3093-200					8,12	8,12		
B-48 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC02				
B-48	3494-846	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,02	19,02	2,77	4,61
	3494-846					10,44	10,44		
B-48	3912-128	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,02	19,02	2,77	4,61
	3912-128					10,44	10,44		
B-48 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2405	0,2405		
B-48 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,1977	0,1977		
B-48 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2438	0,2438	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS			ATC: A02BC02				
B-48	2575-579	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		11,58	11,58	1,26	2,10
	2575-579					4,75	4,75		
B-48	2575-553	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,98	15,98	2,15	3,59
	2575-553					8,12	8,12		
B-48 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS			ATC: A02BC02				
B-48	2575-538	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,39	19,39	2,84	4,74
	2575-538					10,72	10,72		
B-48 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
B-48 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2029	0,2029		
B-48 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PARIET 10 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: A02BC04				
B-48	1555-804	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R		13,27	13,27	1,60	2,67
	1555-804					6,05	6,05		
B-48 *	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R		0,1395	0,1395		
B-48 **	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R		0,1145	0,1145		
B-48 ***	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R		0,1412	0,1412	0,0286	0,0477
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: A02BC01				
B-48	2108-728	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R		13,35	13,35	1,62	2,70
	2108-728					6,10	6,10		
B-48 *	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R		0,1405	0,1405		
B-48 **	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R		0,1155	0,1155		
B-48 ***	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R		0,1425	0,1425	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01	

B-48	2108-751	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	18,86	18,86	2,74	4,56
	2108-751				10,32	10,32		
B-48	2451-961	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	23,10	23,10	3,60	6,01
	2451-961				13,59	13,59		
B-48 *	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1754	0,1754		
B-48 **	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1441	0,1441		
B-48 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1773	0,1773	0,0360	0,0601

Paragraaf 30000

Protonpompinhibitoren (ATC A02BC) vergoedbaar in categorie C:

Paragraphe 30000

Inhibiteurs de la pompe à protons (ATC A02BC) remboursables en catégorie C:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg			EUROGENERIC	ATC: A02BC05				
C-31	2893-477	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,53	8,53	2,15	2,15
	2893-477				2,43	2,43		
C-31	2893-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,80	10,80	3,68	3,68
	2893-485				4,16	4,16		
C-31 *	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
C-31 **	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
C-31 ***	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1269	0,1269	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	ATC: A02BC05				
C-31	2738-516	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,54	10,54	3,50	3,50
	2738-516				3,96	3,96		
C-31 *	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1251	0,1251		
C-31 **	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
C-31 ***	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1268	0,1268	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg			VIATRIS	ATC: A02BC05				
C-31	2886-687	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,90	10,90	3,74	3,74
	2886-687				4,23	4,23		
C-31 *	0753-772	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1373	0,1373		

C-31 **	0753-772	hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-31 ***	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03				
C-31	3318-771	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,69	14,69	6,30	6,30
	3318-771				7,13	7,13		
C-31 *	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3220	0,3220		
C-31 **	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2645	0,2645		
C-31 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3244	0,3244	0,0661	0,1102
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31	2341-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	10,37	10,37	3,39	3,39
	2341-485				3,83	3,83		
C-31 *	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
C-31 **	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
C-31 ***	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC03		
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,20	15,20	6,65	6,65
	2341-535				7,52	7,52		
C-31 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
C-31 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
C-31 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0444	0,0747
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
C-31	1596-980	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	10,91	10,91	3,75	3,75
	1596-980				4,24	4,24		
C-31 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
C-31 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
C-31 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
C-31	4380-101	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,86	8,86	2,37	2,37
	4380-101				2,68	2,68		
C-31 *	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1235	0,1235		
C-31 **	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1014	0,1014		
C-31 ***	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1252	0,1252	0,0254	0,0423
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC01		

chapitre: IV)								
C-31	3078-144	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,85	12,85	5,06	5,06
	3078-144				5,72	5,72		
C-31 *	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1754	0,1754		
C-31 **	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1441	0,1441		
C-31 ***	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1773	0,1773	0,0360	0,0601
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2227-130	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,85	12,85	5,06	5,06
	2227-130				5,72	5,72		
C-31 *	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2636	0,2636		
C-31 **	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2164	0,2164		
C-31 ***	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2673	0,2673	0,1807	0,1807
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
C-31	1767-235	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	7,72	7,72	1,52	1,52
	1767-235				1,72	1,72		
C-31	1767-250	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,95	8,95	2,42	2,42
	1767-250				2,74	2,74		
C-31 *	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
C-31 **	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1123	0,1123		
C-31 ***	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1387	0,1387	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1724-772	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,84	8,84	2,35	2,35
	1724-772				2,66	2,66		
C-31	1767-326	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,86	12,86	5,06	5,06
	1767-326				5,73	5,73		
C-31 *	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-31 **	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
C-31 ***	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3546-116	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,86	12,86	5,06	5,06
	3546-116				5,73	5,73		
C-31 *	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1901	0,1901		

C-31 **	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
C-31 ***	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2801-504	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorridor)	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	8,86	8,86	2,37	2,37
	2801-504				2,68	2,68		
C-31	2726-164	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorridor)	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	12,96	12,96	5,14	5,14
	2726-164				5,81	5,81		
C-31 *	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1849	0,1849		
C-31 **	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
C-31 ***	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0380	0,0633
OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: A02BC01								
C-31	1712-215	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	9,19	9,19	2,59	2,59
	1712-215				2,93	2,93		
C-31 *	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
C-31 **	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
C-31 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1386	0,1386	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1712-223	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	9,01	9,01	2,47	2,47
	1712-223				2,79	2,79		
C-31	1705-441	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	13,20	13,20	5,29	5,29
	1705-441				5,99	5,99		
C-31 *	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
C-31 **	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
C-31 ***	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
C-31	2141-158	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	9,08	9,08	2,52	2,52
	2141-158				2,85	2,85		
C-31 *	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1239	0,1239		
C-31 **	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1018	0,1018		
C-31 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1256	0,1256	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2582-831	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,97	8,97	2,43	2,43

C-31	2582-831 1729-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	2,75 13,14	2,75 13,14	5,26	5,26
C-31 *	1729-169 0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	5,95 0,1894	5,95 0,1894		
C-31 **	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
C-31 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-197	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	2,16	2,16
C-31 *	2557-197 0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,44 0,1048	2,44 0,1048		
C-31 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-155	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,53	12,53	4,84	4,84
C-31 *	2557-155 0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	5,48 0,2470	5,48 0,2470		
C-31 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	4381-091	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,49	8,49	2,11	2,11
C-31 *	4381-091 7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,39 0,1019	2,39 0,1019		
C-31 **	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
C-31 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0209	0,0349
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	4381-133	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,14	12,14	4,58	4,58
C-31 *	4381-133 7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	5,18 0,2334	5,18 0,2334		
C-31 **	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1918	0,1918		
C-31 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2366	0,2366	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC02								
C-31	2650-414	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,49	8,49	2,11	2,11
C-31 *	2650-414 7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,39 0,1039	2,39 0,1039		
C-31 **	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0853	0,0853		
C-31 ***	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1053	0,1053	0,0213	0,0356
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC02								
C-31	2650-448	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,14	12,14	4,58	4,58
	2650-448				5,18	5,18		

C-31 *	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2380	0,2380		
C-31 **	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1955	0,1955		
C-31 ***	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2412	0,2412	0,0489	0,0816
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-053	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,52	8,52	2,14	2,14
	2568-053				2,42	2,42		
C-31 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-087	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,23	12,23	4,64	4,64
	2568-087				5,25	5,25		
C-31 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2555-159	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	2,16	2,16
	2555-159				2,44	2,44		
C-31 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2555-118	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,25	12,25	4,66	4,66
	2555-118				5,27	5,27		
C-31 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3025-145	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	2,16	2,16
	3025-145				2,44	2,44		
C-31 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3025-160	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,17	12,17	4,61	4,61
	3025-160				5,21	5,21		
C-31 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2405	0,2405		
C-31 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1977	0,1977		
C-31 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2438	0,2438	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
C-31	2575-512	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	2,16	2,16

	2575-512					2,44	2,44		
C-31 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
C-31 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
C-31 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg VIATRIS ATC: A02BC02									
C-31	2575-546	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		12,53	12,53	4,84	4,84
	2575-546					5,48	5,48		
C-31 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
C-31 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2029	0,2029		
C-31 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01									
C-31	2108-694	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R		7,73	7,73	1,53	1,53
	2108-694					1,73	1,73		
C-31	2108-702	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R		8,88	8,88	2,38	2,38
	2108-702					2,69	2,69		
C-31 *	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R		0,1405	0,1405		
C-31 **	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R		0,1155	0,1155		
C-31 ***	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R		0,1425	0,1425	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01									
C-31	2108-736	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R		8,88	8,88	2,38	2,38
	2108-736					2,69	2,69		
C-31	2108-744	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R		12,99	12,99	5,15	5,15
	2108-744					5,83	5,83		
C-31 *	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R		0,1754	0,1754		
C-31 **	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R		0,1441	0,1441		
C-31 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R		0,1773	0,1773	0,0360	0,0601

Paragraaf 4000

Fibraten (ATC C10AB) :

1° wetenschappelijk verantwoorde aanbevelingen over het gebruik en het voorschrijven van de betrokken therapeutische klassen of sub-klassen van farmaceutische specialiteiten, gebaseerd op de principes van "evidence-based medicine", zoals bedoeld in artikel 73, § 2, tweede lid van de Wet, waarvan de naleving aanleiding geeft tot de vergoeding van het voorschrift:

a) De specialiteiten vermeld in punt c) komen voor vergoeding in aanmerking in categorie B, wanneer ze zijn toegediend bij rechthebbenden voor :

1. de behandeling in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie (gedefinieerd als totaal cholesterol \geq 190 mg/dl, of LDL-cholesterol \geq 115 mg/dl, nuchter gemeten tijdens minstens twee afnames met 1 tot 8 weken tussentijd, in een stabiele toestand, onder een aangepast dieet), voor zover deze zich in de volgende risicosituatie bevinden:

Paragraphe 4000

Fibrates (ATC C10AB):

1° recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur les principes de «evidence-based medicine», comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la Loi, dont le respect donne lieu à une prescription remboursée :

a) Les spécialités mentionnées au point c) font l'objet d'un remboursement en catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour :

1. le traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total \geq 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol \geq 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans la situation à risque suivante:

de berekening van het individuele absolute cardio-vasculaire risico een resultaat geeft nu (of had, of zou geven op een bepaalde datum (*)) gelijk of hoger dan 5 % op 10 jaar, waarbij dit risico werd berekend op basis van het SCORE model aangepast aan de Belgische situatie ((Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) rekening houdend met de leeftijd, het geslacht, het cholesterolniveau, de systolische arteriële druk en tabagisme.

(*) in het geval dat het volgen van een behandeling met een hypolipemierend geneesmiddel momenteel een verbetering van zijn/haar risicoprofiel heeft veroorzaakt.

De vergoeding in monotherapie van een primaire hyper-cholesterolemie is toegestaan voor zover de behandeling een van de drie volgende situaties beoogt:

1. Ofwel intolerantie of contra-indicaties voor statines;
2. Ofwel een triglyceridenspiegel hoger dan 190 mg/dl;
3. Ofwel een HDL cholesterol lager dan 40 mg/dl.

2. de behandeling in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie (gedefinieerd als totaal cholesterol \geq 175 mg/dl, of LDL-cholesterol \geq 100 mg/dl, nuchter gemeten tijdens minstens twee afnames met 1 tot 8 weken tussentijd, in een stabiele toestand, onder een aangepast dieet), voor zover deze zich in minstens één van de twee volgende risicosituaties bevinden:

2.1. Antecedent van minstens een arteriële aandoening, grondig gedocumenteerd door een bijkomend technisch onderzoek in het medisch dossier dat door de voorschrijver voor deze patiënt wordt bijgehouden:

- 2.1.1. ofwel coronair : infarctus, geobjectiveerde angor, acuut coronair syndroom, aorto-coronaire bypass, coronaire angioplastie;
- 2.1.2. ofwel cerebraal : cerebrovasculair thrombotisch accident, gedocumenteerd transitair ischemisch accident;
- 2.1.3. ofwel perifeer: gedocumenteerd claudicatio intermittens.

2.2. Type 2 diabetes indien de patiënt ouder is dan 40 jaar ; Type 1 diabetes indien microalbuminurie aanwezig is.

De vergoeding in monotherapie van een primaire hyper-cholesterolemie is toegestaan voor zover de behandeling een van de drie volgende situaties beoogt:

1. Ofwel intolerantie of contra-indicaties voor statines;
2. Ofwel een triglyceridenspiegel hoger dan 190 mg/dl;
3. Ofwel een HDL cholesterol lager dan 40 mg/dl.

3. Behandeling in bi-therapie

3.1. Hetzij het fibraat wordt toegevoegd aan een voorafgaande behandeling met een statine, voor zover de voorafgaande toediening van deze statine terugbetaald was aan de patiënt in categorie B conform aan de voorwaarden in de paragraaf met betrekking tot dit statine en als het triglyceridegehalte van de patiënt hoger blijft dan 190 mg/dl ondanks een behandeling van tenminste 3 maanden met dit statine, gebruikt in monotherapie aan de maximaal getolereerde dosis toegelaten voor terugbetaling.

3.2. Hetzij het gaat om de situatie waarbij acipimox wordt toegevoegd aan een voorafgaande behandeling van tenminste 3 maanden met een fibraat, van toepassing in punt a) 3.2. van de paragraaf met betrekking tot acipimox in het hoofdstuk IV van het KB van 21.12.2001.

In het geval van een bi-therapie beschikt de voorschrijvende arts, in het medisch dossier dat hij bijhoudt voor deze patiënt, over een voorafgaand advies van een geneesheer-specialist in de interne

Le calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme

(*) dans le cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque.

Le remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que le traitement vise une des trois situations suivantes :

1. soit intolérance ou contre-indications aux statines
2. soit taux de triglycérides sériques supérieur à 190 mg/dl ;
3. soit cholestérol HDL inférieur à 40 mg/dl.

2. le traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total \geq 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol \geq 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes

2.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans le dossier médical tenu par le prescripteur pour le patient concerné :

- 2.1.1. soit coronaire : infarctus, angor objectivé, syndrome coronarien aigu, pontage aorto-coronaire, angioplastie coronaire ;
- 2.1.2. soit cérébrale: accident vasculaire cérébral thrombotique, accident ischémique transitoire documenté ;
- 2.1.3. soit périphérique : claudication intermittente documentée.

2.2. Diabète type 2 si le patient est âgé de plus de 40 ans ; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie

Le remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que le traitement vise une des trois situations suivantes :

1. Soit intolérance ou contre-indications aux statines ;
2. Soit taux de triglycérides sériques supérieur à 190 mg/dl ;
3. Soit cholestérol HDL inférieur à 40 mg/dl.

3. Traitement en bi-therapie

3.1. Soit le fibrate est ajouté à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que le taux de triglycérides du patient reste supérieur à 190 mg/dl malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable.

3.2. Soit il s'agit de la situation où de l'acipimox est ajouté à un traitement préalable d'au moins 3 mois par fibrate, en application du point a) 3.2. du paragraphe relatif à l'acipimox dans le chapitre IV de l'AR du 21.12.2001.

Dans tous les cas de bi-therapie, le médecin prescripteur dispose, dans le dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en

geneeskunde, in de cardiologie of in de pediatrie (als de patiënt jonger is dan 18 jaar) die de noodzaak van deze bi-therapie bevestigt.

4. Beperking van het risico op acute pancreatitis bij de rechthebbenden die een ernstige hypertriglyceridemie vertonen, gedefinieerd door een triglyceridegehalte dat hoger blijft dan de 400 mg/dl ondanks adequate hygiëno-dietische maatregelen.

b) Bovendien moet het voorschrift dat aanleiding geeft tot vergoeding opgesteld zijn, conform aan volgende voorwaarden:

1. de voorschrijvend arts houdt rekening met een vergoedbare maximale dosering die beperkt is tot de dagelijkse maximumdosis die in de officiële bijsluiter is bepaald;
2. de voorschrijvend arts gaat de impact van de behandeling na door jaarlijks een lipidenprofiel uit te voeren, waarvan melding wordt gemaakt in het medisch dossier dat voor deze patiënt wordt bijgehouden ;
3. de voorschrijvend arts houdt rekening met de niet vergoeding van een specialiteit voorkomend onder punt c), tegelijk met een ander hypolipemiërend geneesmiddel (statine, fibraat, resinaat, of een nicotinezuurderivaat), behalve indien aan de voorwaarden voor de bedoelde associatie, zoals ze voorkomen in de reglementering van het andere hypolipemiërend geneesmiddel, is voldaan.

c) Overgangsmaatregelen:

Ten titel van overgangsmaatregel kunnen attesten waarvan het model is vastgelegd onder "d" van bijlage III van het huidige besluit, en die afgeleverd zijn voor het in voege treden van de huidige reglementering voor specialiteiten die in deze paragraaf vermeld zijn, hun geldigheid bewaren binnen hun vergoedings-categorie tot de uiterste datum van de toegestane periode, vermeld op deze machtigingen.

2° de elementen waarover de zorgverlener moet beschikken teneinde de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de adviserend geneesheren van de verzekeringsinstelling in staat te stellen na te gaan of de afgeleverde farmaceutische specialiteiten die aanleiding hebben gegeven tot vergoeding door de zorgverlener werden voorgeschreven overeenkomstig de vastgestelde vergoedingsvoorwaarden:

Criterium dat voorkomt in de aanbevelingen:

1 . Primaire hypercholesterolemie (*)

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard: /
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemiërend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, en wanneer de voorschrijvend arts niet meer over de oude biologische protocollen zou beschikken, mag worden aangenomen dat de voorwaarde voor het stellen van de diagnose van primaire hypercholesterolemie is vervuld op grond van de vergoeding die is toegekend in het raam van de oude bepalingen.

2. Aanwezigheid van een totaal serumcholesterol \geq 190 mg/dl, of van een LDL-cholesterol \geq 115 mg/dl (respectievelijk 175 mg/dl en 100 mg/dl in geval van antecedent van minstens één arteriële aandoening of van diabetes – cf punten 1.2.1 en 1.2.2), in een nuchtere toestand en ten minste tweemaal gemeten, met een tussentijd van 1 tot 8 weken (*), in een stabiele toestand en met een aangepast dieet

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:
(Gedateerde) protocollen van de twee biologische testen door laboratoria voor klinische biologie.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*)Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemiërend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, wordt de voorwaarde betreffende de tussentijd van 1 tot 8 weken tussen de twee bloedonderzoeken als

pédiatrie (si le patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie.

4. Réduction du risque de pancréatite aiguë chez des bénéficiaires qui présentent une hypertriglycéridémie sévère, définie par un taux de triglycérides restant supérieur à 400 mg/dl malgré des mesures hygiéno-diététiques adéquates.

b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes :

1. le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle ;
2. le médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans le dossier médical tenu pour ce patient ;
3. le médecin prescripteur tient compte du non remboursement d'une spécialité figurant au point c) simultanément avec celui d'une autre spécialité hypolipémiante (statine, fibrate, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque les conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.

c) Mesures transitoires :

A titre transitoire, les autorisations dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans le présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver leur validité dans leur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations.

2° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si les spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par le dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies :

Critère figurant dans les recommandations :

1 .Hypercholestérolémie primaire (*)

- Eléments à conserver dans le dossier: /
- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, et dans le cas où le médecin prescripteur ne disposerait plus des anciens protocoles biologiques, on peut considérer que la condition relative à l'établissement du diagnostic de d'hypercholestérolémie primaire est remplie sur base de l'existence du remboursement accordé dans le cadre des anciennes dispositions.

2. Présence d'un cholestérol sérique total \geq 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol \geq 115 mg/dl (respectivement 175 mg/dl et 100 mg/dl en cas d'antécédent d'au moins une atteinte artérielle ou de diabète – cfr points 1.2.1 et 1.2.2), mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines (*) d'intervalle, en état stable, sous régime approprié

- Eléments à conserver dans le dossier :
Protocoles (datés) des deux biologiques, émanant de laboratoires de biologie clinique.

- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, la condition relative à l'intervalle de 1 à 8 semaines entre les deux examens sanguins est considérée comme remplie sur base

vervuld beschouwd op grond van de naleving van de periode «van minstens 3 maanden» die in de oude bepalingen was vastgesteld.

3. Berekening (*) van het individueel absoluut cardiovasculair risico

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard: /
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Voor de rechthebbenden die al op 30 november 2003 sedert minstens 3 jaar een vergoeding hadden gekregen voor een statine ter behandeling van hypercholesterolemie, en welke op die datum ten minste 75 jaar oud waren en geen enkele gedocumenteerde arteriële aandoening vertoonden, moet het globaal cardiovasculair risico niet worden berekend opdat zij de vergoeding van het voorschrift voor een fibraat kunnen blijven genieten.

3.1.> = 5 % op 10 jaar (Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) rekening houdende met de leeftijd, het geslacht,

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:
Vermelding van het berekeningsresultaat en van de verschillende elementen die voor de vaststelling ervan in aanmerking zijn genomen, alsook vermelding van de datum of het tijdvak (*) waarop die berekening betrekking heeft
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) De verschillende metingen die bij de berekening in aanmerking worden genomen, moeten binnen een zelfde tijdvak van maximaal 30 dagen zijn verricht.

3.2. Het serumcholesterol-gehalte (*),

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:
Als het om een andere biologische test gaat dan die vermeld in punt 1.1.: (Gedateerd) protocol van een laboratorium voor klinische biologie.
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*)Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemierend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, en wanneer de voorschrijvend arts niet meer over de oude biologische protocollen zou beschikken, mag worden uitgegaan van een totale cholesterolwaarde van 250mg/dl voor het uitvoeren van de berekening.

3.3. De arteriële systolische druk

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:
Vermelding van de (gedateerde) effectief gemeten waarde (*) en van de eventuele behandeling met antihypertensiva.
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Indien de effectief gemeten waarde genormaliseerd is ten gevolge van een behandeling met anti-hypertensiva, mag voor de berekening worden uitgegaan van een waarde van 160/90 mm Hg.

3.4. Tabaksgebruik

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:
Vermelding van de aard, de ernst (*) en het aantal jaren tabaksgebruik,
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) aantal sigaretten, of pakjes of hoeveelheid tabak, enz.

4. Diabetes mellitus

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:
Vermelding van het type diabetes, het aantal jaren dat men aan diabetes lijdt, met bevestiging van de diagnose door een of meer afdoende

du respect de la période “d’au moins 3 mois” qui était fixée dans les anciennes dispositions.

3. Calcul (*) du risque cardiovasculaire absolu indivi-duel

- Eléments à conserver dans le dossier : /
- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d’une statine depuis au moins 3 ans en date du 30 novembre 2003 pour traiter une hypercholéstérolémie, et qui, à cette date, étaient âgés d’au moins 75 ans sans avoir présenté aucune atteinte artérielle documentée, il n’est pas nécessaire de réaliser chez eux un calcul du risque cardiovasculaire global pour que la prescription d’un fibraté puisse continuer à leur être remboursée.

3.1.>= 5 % à 10 ans ((Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l’âge, du sexe

- Eléments à conserver dans le dossier :
Mention du résultat du calcul et des différents éléments qui ont été pris en compte pour son établissement, ainsi que mention de la date, ou de la période (*), à laquelle se rapporte ce calcul
- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Les différentes mesures prises en compte dans le calcul doivent avoir été effectuées pendant une même période ne dépassant pas 30 jours.

3.2. Du taux de cholestérol sérique (*)

- Eléments à conserver dans le dossier :
S’il s’agit d’une biologie autre que celles figurant au point 1.1. : Protocole (daté) émanant d’un laboratoire de biologie clinique.
- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d’un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholéstérolémie, et dans le cas où le médecin prescripteur ne disposerait plus des anciens protocoles biologiques, on peut utiliser une valeur présumée de cholestérol total de 250mg/dl pour effectuer le calcul.

3.3. De la pression artérielle systolique

- Eléments à conserver dans le dossier :
Mention de la valeur (datée) effectivement mesurée (*) et du traitement anti-hypertensif éventuel.
- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Si la valeur effectivement mesurée est normalisée du fait de l’existence d’un traitement anti-hypertensif, on peut utiliser une valeur présumée de 160/90 mm Hg pour effectuer le calcul.

3.4. Du tabagisme

- Eléments à conserver dans le dossier :
Mention de la nature du tabagisme, de son intensité (*), et de son ancienneté
- Remarques et/ou situations particulières :

(*) nombre de cigarettes, ou de paquets, ou quantité de tabac, etc.

4. Diabète sucré

- Eléments à conserver dans le dossier :
Mention du type de diabète et de son ancienneté, avec confirmation du diagnostic par une ou des biologies démonstratives, et/ou par un ou des

biologische testen en/of een of meer medische protocollen.

Vermelding van de aanwezigheid van microalbuminurie indien type 1 diabetes, met bevestiging van de diagnose door een of meer afdoende biologische testen en/of een of meer medische protocollen.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties: /

5. Intolerantie of contra-indicatie voor statines

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Beschrijving en documentatie van de nevenwerkingen en/of andere elementen die aanleiding gegeven hebben tot de diagnose van intolerantie of contra-indicatie voor statines

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties: /

3° de elementen waarover de zorgverlener moet beschikken indien de behandeling door een andere zorgverlener werd gestart:

Attest, verslag of protocol van een andere geneesheer die bevestigt dat hij in zijn eigen dossier over de elementen beschikt die nodig zijn om aan te tonen dat het voorschrift van een fibraat vermeld in punt 1°, c) van deze paragraaf bij de betrokken patiënt overeenstemt met de aanbevelingen in punt 1° en met de voorwaarden in punt 2° van die paragraaf. Dit document is niet nodig wanneer het gaat om een voorschrift dat voor een in een ziekenhuis opgenomen patiënt afgeleverd is door een ziekenhuisapotheek met het oog op de voortzetting van een lopende ambulante behandeling in het ziekenhuis; in dat geval vermeldt de voorschrijver dat in het dossier.

4° de maximale geldigheidsperiode waarna de in 2° en 3° bedoelde elementen hernieuwd moeten worden:

Die elementen moeten niet worden hernieuwd, maar kunnen eventueel worden aangevuld met andere elementen die bevestigen dat de aanbevelingen zijn nageleefd.

protocoles médicaux.

Mention de la présence de microalbuminurie pour le diabète de type 1, avec confirmation du diagnostic par une ou des biologiques démonstratives, et/ou par un ou des protocoles médicaux.

- Remarques et/ou situations particulières: /

5. Intolérance ou contre-indications aux statines

- Éléments à conserver dans le dossier :

Description et documentation des effets secondaires, donnant lieu au diagnostic d'intolérance ou contre-indications aux statines

- Remarques et/ou situations particulières: /

3° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer si un autre dispensateur de soins a entamé le traitement :

Attestation, rapport, ou protocole d'un autre médecin qui confirme qu'il dispose dans son propre dossier des éléments nécessaires pour démontrer que la prescription d'une fibrate figurant au point 1°, c) du présent § chez le patient concerné est conforme aux recommandations figurant au point 1° et aux conditions figurant au point 2° de ce §. Ce document n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une prescription faisant l'objet d'une délivrance par une officine hospitalière pour un patient hospitalisé en vue de poursuivre à l'hôpital un traitement ambulatoire en cours, et, dans ce cas, le prescripteur en fait mention dans le dossier.

4° La période de validité maximale au terme de laquelle les éléments mentionnés aux points 2° et 3° doivent être renouvelés :

Ces éléments ne doivent pas être renouvelés, mais peuvent, le cas échéant, être complétés par d'autres éléments confirmant le respect des recommandations.

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CEDUR			AUROBINDO NV			ATC: C10AB02		
B-39	1132-901 1132-901	60 omhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés enrobés, 200 mg		11,33 4,56	11,33 4,56	1,21	2,02
B-39 *	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0980	0,0980		
B-39 **	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0805	0,0805		
B-39 ***	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0337
EULITOP			AUROBINDO NV			ATC: C10AB02		
B-39	1158-658 1158-658	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg		11,34 4,57	11,34 4,57	1,21	2,02
B-39 *	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1967	0,1967		
B-39 **	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1613	0,1613		
B-39 ***	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1993	0,1993	0,0403	0,0673

FENOFIBRAAT EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AB05			
B-39	2060-838 2060-838	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	14,35 6,88	14,35 6,88	1,82	3,04	
B-39 *	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0987	0,0987			
B-39 **	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0810	0,0810			
B-39 ***	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0999	0,0999	0,0202	0,0338	
FENOFIBRATE AB 145 mg		AUROBINDO NV				ATC: C10AB05			
B-39	4654-026 4654-026	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	30 comprimés pelliculés, 145 mg	G	11,90 5,00	11,90 5,00	1,33	2,21	
B-39 *	7737-745	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	G	0,2150	0,2150			
B-39 **	7737-745	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	G	0,1767	0,1767			
B-39 ***	7737-745	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	G	0,2180	0,2180	0,0443	0,0737	
FENOGAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05			
B-39	1416-411 1416-411	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	8,75 2,58	8,75 2,58	0,68	1,14	
B-39	1447-796 1447-796	98 capsules, hard, 200 mg	98 gélules, 200 mg	R	13,71 6,38	13,71 6,38	1,69	2,82	
B-39 *	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0840	0,0840			
B-39 **	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0690	0,0690			
B-39 ***	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0851	0,0851	0,0172	0,0288	
FENOGAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05			
B-39	2210-946 2210-946	30 capsules, hard, 267 mg	30 gélules, 267 mg	G	9,54 3,19	9,54 3,19	0,85	1,41	
B-39	2211-209 2211-209	90 capsules, hard, 267 mg	90 gélules, 267 mg	G	17,94 9,61	17,94 9,61	2,55	4,25	
B-39 *	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1378	0,1378			
B-39 **	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1132	0,1132			
B-39 ***	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1397	0,1397	0,0283	0,0472	
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05			
B-39	2451-979 2451-979	60 capsules, hard, 160 mg	60 gélules, 160 mg	G	14,11 6,69	14,11 6,69	1,77	2,96	
B-39 *	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1438	0,1438			
B-39 **	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1182	0,1182			
B-39 ***	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1458	0,1458	0,0295	0,0493	
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C10AB08			
B-39	0226-464 0226-464	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	R	10,23 3,72	10,23 3,72	0,99	1,64	
B-39 *	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1600	0,1600			
B-39 **	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1313	0,1313			
B-39 ***	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547	
LIPANTHYL 67 MICRONISED		VIATRIS				ATC: C10AB05			
B-39	1440-585 1440-585	90 capsules, hard, 67 mg	90 gélules, 67 mg	R	11,32 4,55	11,32 4,55	1,21	2,01	
B-39 *	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0652	0,0652			
B-39 **	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0536	0,0536			

B-39 ***	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0662	0,0662	0,0134	0,0223
LIPANTHYLNANO 145 mg		VIATRIS		ATC: C10AB05				
B-39	2388-700	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	30 comprimés pelliculés, 145 mg	R	11,94	11,94	1,33	2,22
	2388-700				5,03	5,03		
B-39	2388-692	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	90 comprimés pelliculés, 145 mg	R	20,91	20,91	3,15	5,26
	2388-692				11,89	11,89		
B-39 *	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,1704	0,1704		
B-39 **	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,1400	0,1400		
B-39 ***	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,1728	0,1728	0,0350	0,0584

Paragraaf 50000

§ 50000 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraaf 50100

§ 50100 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50200

§ 50200 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50300

§ 50300 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50400

§ 50400 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50500

§ 50500 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50600

§ 50600 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50700

§ 50700 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50800

§ 50800 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50900

§ 50900 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraphe 50000

§ 50000 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraphe 50100

§ 50100 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50200

§ 50200 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50300

§ 50300 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50400

§ 50400 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50500

§ 50500 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50600

§ 50600 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50700

§ 50700 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50800

§ 50800 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50900

§ 50900 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraaf 51000

§ 51000 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60000

§ 60000 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraaf 60100

§ 60100 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60200

§ 60200 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60300

§ 60300 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60400

§ 60400 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60600

§ 60600 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60700

§ 60700 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60800

§ 60800 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60900

§ 60900 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraphe 51000

§ 51000 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60000

§ 60000 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraphe 60100

§ 60100 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60200

§ 60200 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60300

§ 60300 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60400

§ 60400 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60600

§ 60600 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60700

§ 60700 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60800

§ 60800 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60900

§ 60900 est supprimé au 01/04/2020.