Tabel 1: Overzicht van de dosering van DOAC bij gewijzigde nierfunctie

Indicatie	Standaarddosering	CrCl 50-80 ml/min	CrCl 30-49 ml/min	CrCl 15-29 ml/min	CrCl < 15 ml/min
Dabigatran - Pradaxa®					
Preventie van CVA bij atriumfibrilleren.	150 mg, tweemaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing. * Overweeg daling naar 110 mg, tweemaal daags bij patiënten met hoog bloedingsrisico.	Gecontra-indiceerd.	
Preventie van VTE.	220 mg, eenmaal daags.	Geen dosisaanpassing.	150 mg, eenmaal daags.		
Behandeling van DVT en PE.	150 mg, tweemaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing. * Overweeg daling naar 110 mg, tweemaal daags bij patiënten met hoog bloedingsrisico.		
Preventie van recidiverende DVT en PE.	150 mg, tweemaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing. * Overweeg daling naar 110 mg, tweemaal daags bij patiënten met hoog bloedingsrisico.		
Apixaban (Eliquis®)					
Preventie van CVA bij atriumfibrilleren.	5 mg, tweemaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing.	2,5 mg tweemaal daags.	Niet aangeraden.
Preventie van VTE.	2,5 mg, tweemaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing.	Beperkte klinische gegevens tonen aan dat apixaban plasmaconcentraties zijn verhoogd bij deze patiëntenpopulatie, daarom moet apixaban met voorzichtigheid worden gebruikt bij deze patiënten.	Niet aangeraden.
Behandeling van DVT en PE.	10 mg, tweemaal daags gedurende de eerste 7 dagen, gevolgd door 5 mg, tweemaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing.	Apixaban dient met voorzichtigheid te worden gebruikt.	Niet aangeraden.
Preventie van recidiverende DVT en PE.	2,5 mg, tweemaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing.	Apixaban dient met voorzichtigheid te worden gebruikt.	Niet aangeraden.
Rivaroxaban (Xarelto®)					
Preventie van CVA bij atriumfibrilleren.	20 mg, eenmaal daags.	Geen dosisaanpassing.	15 mg, eenmaal daags.	15 mg, eenmaal daags.	
Preventie van VTE.	10mg, eenmaal daags.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing.	Rivaroxaban dient met voorzichtigheid te worden gebruikt.	Niet aangeraden.
Behandeling van acute DVT en PE.	Intensieve behandeling van 15mg, tweemaal daags gedurende 3 weken.	Geen dosisaanpassing.	Geen dosisaanpassing.	Rivaroxaban dient met voorzichtigheid te worden gebruikt.	Niet aangeraden.
Voortzetting van de behandeling en preventie van recidiverende DVT en PE.	20 mg, eenmaal daags.	Geen dosisaanpassing.	20 mg, eenmaal daags 15 mg, eenmaal daags als men het risico op bloedingen voor de patiënt hoger inschat dan het risico op recidief DVT en PE bij patiënten met matige of ernstige nierinsufficiëntie.	20 mg, eenmaal daags. 15 mg, eenmaal daags als men het risico op bloedingen voor de patiënt hoger inschat dan het risico op recidief DVT en PE bij patiënten met matige of ernstige nierinsufficiëntie.	Niet aangeraden.
Edoxaban (Lixiana®)					
Preventie CVA bij atriumfibrilleren.	60 mg, eenmaal daags.	Geen dosisaanpassing.	30 mg, eenmaal daags.	30 mg, eenmaal daags.	Niet aangeraden.
Behandeling van DVT en PE.	60 mg, eenmaal daags.	Geen dosisaanpassing.	30 mg, eenmaal daags.	30 mg, eenmaal daags.	Niet aangeraden.
Preventie van recidiverende DVT en PE.	60 mg, eenmaal daags.	Geen dosisaanpassing.	30 mg, eenmaal daags.	30 mg, eenmaal daags.	Niet aangeraden.

V.U. KAVA © Juni 2016